

Przygotowanie do badań KT.

W przypadku badań z dożylnym podaniem kontrastu tj: Głowa, klatka piersiowa, kończyny, kręgosłupy, tętnice szyjne, tętnice kończyn górnych i dolnych, tętnice mózgowia, aorta, jama brzuszna, miednica, nadnercza :

- na badanie pacjent przychodzi na czczo – nie należy spożywać pokarmów min. 6 godzin przed planowanym badaniem;
- do wykonania badania potrzebny jest aktualny wynik TSH i kreatyniny- badania należy wykonać do 7 dni przed badaniem TK, jeżeli wynik odbiega od normy prawdopodobnie nie będzie można wykonać badania
- Pacjenci chorujący na cukrzycę pobierający leki na cukrzycę (Siofor, Metformin, Metforiato, Glucophage, Gluformin, Metfogamma, Metformax, Metifor itd.) są zobowiązani do ich ostawienia dzień przed badaniem , w dniu badania, jeden dzień po badaniu. W przypadku braku możliwości odstawienia należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.
- Pacjenci chorujący na cukrzycę przyjmujący insulinę :
 - badanie wykonywane do godz. 10.00 – pacjent zgłasza się na czczo, po badaniu zjada posiłek i przyjmuje insulinę
 - jeżeli badanie będzie wykonywane o późniejszej godz. pacjent o 6.00 zjada śniadanie, przyjmuje insulinę do badania zgłosić się o wyznaczonej godzinie.

Do badań tj. jama brzuszna, miednica, nadnercza z kontrastem zabrać do porównania wynik poprzedniego KT, USG, kolonoskopii i gastrokopii, PET, Rezonans Magnetyczny- jeżeli było wykonane.

DO WSZYSTKICH BADAŃ WYMAGAJĄCYCH PORÓWNANIA NALEŻY ZABRAĆ POPRZEDNIE WYNIKI :

KT, USG, kolonoskopii i gastrokopii, PET, Rezonans Magnetyczny.

Badania tomografii komputerowej wykonywane bez dożylnego podania kontrastu nie wymagają specjalnego przygotowania.